



브린텔릭스® 정 5, 10, 20 mg

보티옥세틴브롬화수소산염

브린텔릭스®는 덴마크 H. Lundbeck A/S사가 개발한 항우울제로, 주성분은 보티옥세틴(Vortioxetine)이며, 직접적인 세로토닌 수용체 활성 조절 및 세로토닌(5-HT) 수송체를 억제하는 두 가지 작용기전을 가지고 있습니다. 브린텔릭스®는 이러한 다중모드 작용기전을 통해 주요우울장애에 대하여 치료효과를 나타냅니다.

원료약품 및 구분량

- 브린텔릭스®정 5mg:** 이 약 1정(154.5 mg) 중
 - 유효성분: 보티옥세틴브롬화수소산염(법규) 6.355mg (보티옥세틴으로서 5mg)
 - 첨가제: 만니톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 오파드라이분홍(03B31490), 히드록시프로필셀룰로오스
- 브린텔릭스®정 10mg:** 이 약 1정(154.5 mg) 중
 - 유효성분: 보티옥세틴브롬화수소산염(법규) 12.710mg (보티옥세틴으로서 10mg)
 - 첨가제: 만니톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 오파드라이노랑(03B22082), 히드록시프로필셀룰로오스
- 브린텔릭스®정 20mg:** 이 약 1정(153 mg) 중
 - 유효성분: 보티옥세틴브롬화수소산염(법규) 25.420mg (보티옥세틴으로서 20mg)
 - 첨가제: 만니톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 오파드라이빨강(03B25006), 히드록시프로필셀룰로오스

성상

브린텔릭스®정 5mg: 한쪽 면에 "L" 다른쪽 면에 "5"가 새겨진 분홍색의 달걀형 필름코팅정
브린텔릭스®정 10mg: 한쪽 면에 "L" 다른쪽 면에 "10"가 새겨진 노란색의 달걀형 필름코팅정
브린텔릭스®정 20mg: 한쪽 면에 "L" 다른쪽 면에 "20"가 새겨진 빨간색의 달걀형 필름코팅정

효능·효과

주요우울장애의 치료

용법·용량

- 성인**
이 약의 초기용량 및 권장용량은 1일 1회 10mg입니다. 환자의 반응에 따라 1일 최대 20mg까지 증량하거나, 최소 5mg까지 감량할 수 있습니다. 이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있습니다.
 - 유지투여
우울증상이 소멸된 후에도 치료 효과를 확실하게 하기 위하여 최소 6개월간의 약물치료가 권장됩니다.
 - 투여중단
이 약은 점진적으로 용량을 감량할 필요 없이 즉시 중단할 수 있습니다.
- 고령자에 대한 투여**
65세 이상의 고령자에서는 1일 1회 5mg을 초기용량으로 하고, 이 약을 1일 10mg 이상 투여할 경우는 주의깊게 치료합니다.
- 사이토크롬 P450 저해제 및 유도제와의 투여**
 - 사이토크롬 P450 저해제 (Cytochrome P450 inhibitors)
강력한 사이토크롬 P450 저해제 (예: 부프로피온, 퀴니딘, 플루옥세틴, 파록세틴 등)를 병용 투여하는 경우, 환자의 반응에 따라 이 약의 용량을 감소시킵니다(6. 상호작용항 참조).
 - 사이토크롬 P450 유도제 (Cytochrome P450 inducers)
광범위한 사이토크롬 P450 유도제 (예: 리팜피신, 카르바마제핀, 페니토인 등)를 병용투여하는 경우, 환자의 반응에 따라 이 약의 용량을 조절할 수 있습니다(6. 상호작용항 참조).
- 모노아민산화효소 저해제(MAO)와의 투여**
 - 정신질환 치료를 하기 위한 MAO 저해제 전환 관련
정신질환 치료를 위한 MAO저해제 투약을 중단하고 이 약으로 치료를 시작할 경우 적어도 14일 이상 간격을 두어야 합니다. 반대로, 정신질환 치료를 위해 MAO 저해제 투약을 시작하려면 두 제제 투약 중단 후 적어도 14일이 경과해야 합니다.
 - 리네졸리드 또는 메틸렌블루와 같은 다른 MAO저해제
리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루 제제를 투여받는 환자는 세로토닌 증후군 위험성 증가 때문에 동 제제 투여를 시작해서는 안됩니다. 임원을 포함한, 다른 중재적 시술을, 더 긴급한 정신질환적 상태 치료를 필요로 하는 환자의 경우는 이 약의 투여여부를 고려해야 합니다. 이 동 제제를 투여받는 환자에게 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루 제제를 긴급히 투여할 필요가 있을 수 있으며, 리네졸리드나 정맥주사용 메틸렌블루 제제에 대한 대체약물이 없고 특정환자에서 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루 제제 치료의 유익성이 세로토닌 증후군 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 동 제제를 즉시 중단하고 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루 제제를 투여할 수 있습니다. 환자는 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루 제제를 투여한 지 2주 또는 마지막 투여 후 24시간 중 먼저 오는 시점에서 세로토닌 증후군 증상을 모니터링해야 합니다. 리네졸리드 또는 정맥주사용 메틸렌블루 제제 마지막 투여로부터 24시간 후 동 제제 치료를 다시 시작할 수 있습니다. 비정맥주사용(경구정제 또는 국소주사)로 메틸렌블루 제제 투여 또는 동 제제를 1mg/kg 이하 정맥주사한 경우에 대한 위험성은 명확하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 임상의는 이러한 사용에 대한 세로토닌 증후군의 응급증상 가능성을 인지해야 합니다.

사용상의 주의사항

- 경고**
 - 자살성향 및 항우울제
주요우울증이나 다른 정신과적 질환을 가진 소아, 청소년 및 젊은 성인(18~24세)에 대한 단기간의 연구에서 항우울제가 위약에 비해 자살 충동과 행동(자살 성향)의 위험도를 증가시킨다는 보고가 있습니다. 소아, 청소년 또는 젊은 성인에게 이 약이나 다른 항우울제 투여를 고려 중인 의사는 임상적인 필요성이 위험성보다 높은지 항상 신중하게 고려해야만 합니다. 단기간의 연구에서 25세 이상의 성인에서는 위약과 비교하였을 때 항우울제가 자살 성향의 위험도를 증가시키지 않았고, 65세 이상의 성인에서는 위약에 비해 항우울제에서 이러한 위험이 감소하였습니다. 우울증 및 다른 정신과적 질환 자체가 자살 위험 증가와 관련이 있습니다. 항우울제로 치료를 시작한 모든 연령의 환자에 대해 적절한 모니터링을 실시하여야 하며 질환의 악화, 자살 성향 또는 적개심, 공격성, 분노 등 다른 비정상적인 행동의 변화가 있는지 주의 깊게 관찰하여야 합니다. 환자의 가족이나 보호자 또한 환자를 주의 깊게 관찰하고 필요한 경우 의사와 연락하도록 지도합니다. 이 약은 소아 및 청소년에서의 사용은 승인되지 않았습니다.
 - 세로토닌 증후군
이 약에 의해 잠재적으로 생명을 위협하는 세로토닌 증후군이나 신경이완제 약성 증후군이 발생할 수 있습니다. 다른 세로토닌성 약물(아편계(펜타닐 등), 트립탄계, 삼환계 항우울제, 리튬, 트라마돌, 트립탄, 부스피론 및 성요한풀(St. John's Wort) 포함), 세로토닌 대사를 저해하는 약물(특히, 경신계 질환 치료 또는 리네졸리드, 정맥주사용 메틸렌블루와 같은 그 외의 약물을 포함한 MAO 억제제 포함), 항정신병약, 기타 도파민 억제제를 병용 투여할 때 세로토닌 증후군이나 신경이완제 약성 증후군의 위험성이 증가됩니다. 세로토닌 증후군이나 신경이완제 약성 증후군의 징후 및 증상의 발현에 대해 환자들을 모니터링 하여야 합니다. 세로토닌 증후군 증상은 정신상태 변화(예: 초조, 환각, 섬망, 혼수), 자율신경불안증(예: 빈맥, 불안정한 혈압, 현기증, 발한, 홍조, 고열), 신경근 증상(예: 떨림, 경축, 간대성근경련, 반사항진, 조화운동장애), 발작 및/또는 위장관계 증상(예: 구역, 구토, 설사)을 포함할 수 있습니다. 이러한 증상이 발생하면, 즉시 이 약의 투여를 중단하고 대증요법을 시작해야 합니다. 이 약을 경신계 질환 치료 목적의 MAO 억제제와 병용 투여해서는 안됩니다. 또한 리네졸리드나 정맥주사용 메틸렌블루와 같은 MAO 억제제 치료를 받고 있는 환자들에게 이 약의 투여를 시작해서는 안됩니다. 메틸렌블루의 투여 경로가 제공된 모든 보고는 1~8 mg/kg 용량 범위에서의 정맥주사에 관한 것이었으며, 메틸렌블루의 다른 투여 경로(기경, 경구용 정제나 국소용 주사제)나 더 낮은 용량 투여에 대한 보고는 없었습니다. 이 약을 복용 중인 환자에게 리네졸리드나 정맥주사용 메틸렌블루와 같은 MAO 억제제 치료를 시작해야 할 상황이 있을 수 있습니다. 이런 경우에는 MAO 억제제 치료를 시작하기 전에 이 약의 투여를 중단해야 합니다. 이 약과 도파민계, 삼환계 항우울제, 아편계(펜타닐 등), 리튬, 트라마돌, 부스피론, 트립탄 및 성요한풀(St. John's Wort)을 포함한 기타 세로토닌성 약물과의 병용 투여가 임상적으로 필요한 경우, 특히 투여 개시 및 용량 증가시에 세로토닌 증후군에 대한 위험이 증가될 수 있음을 환자에게 알려야 합니다. 만약 위의 증상이 나타나면 즉시 이 약과 세로토닌성 약물과의 병용 투여를 중단하고 보조적인 대증요법을 시작하여야 합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 이 약의 주성분 또는 이 약의 다른 성분에 과민성이 있는 환자
- MAO 저해제를 복용하고 있거나, 투여 중단후 14일이 지나지 않은 환자(세로토닌 증후군의 위험이 증가될 수 있습니다. '1. 경고' 및 '6. 상호작용' 참조)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것**
 - 발작의 병력이 있거나 불안정한 간질이 있는 환자('5. 일반적 주의'항 참조)
 - 조증, 경조증 또는 양극성장애 환자('5. 일반적 주의'항 참조)
 - 중증 신장애 환자('10. 신장애 및 간장애 환자'항 참조)
 - 중증 간장애 환자('10. 신장애 및 간장애 환자'항 참조)
 - 출혈경향이 있는 환자, 항응고제 또는 혈소판 기능에 영향을 주는 약물을 투여받고 있는 환자('5. 일반적 주의'항 참조)
 - 고령자, 간경화가 있거나 저나트륨혈증을 야기할 수 있는 약물을 투여 중인 환자(저나트륨혈증의 위험이 있음)
- 이상반응**
가장 흔한 이상반응은 구역이었습니다. 이상반응은 대개 경미하거나 중등도 이었고, 이 약 투여 시작 후 처음 2주 내에 발생하였습니다. 이상반응은 보통 일시적이었으며, 일반적으로 치료 중단을 유발하지 않았습니다. 구역과 같은 위장 장애는 남성보다 여성에서 흔히 발생하였습니다. 이상반응은 다음의 발현 빈도별로 정리하였습니다: 매우 흔함(>1/10), 흔함(>1/100 에서 <1/10), 흔하지 않음(>1/1000 에서 <1/100), 드물음(>1/10000 에서 <1/1000), 매우 드물음(<1/10000), 또는 알려지지 않음(주어진 자료에서 측정 불가능).

기관계 분류	빈도	이상반응
면역계 장애	알려지지 않음*	아나필락시스 반응
내분비계 장애	알려지지 않음*	고프로락틴혈증
호흡기, 흉부, 종격이상	알려지지 않음*	코피
대사 및 영양장애	흔함	식욕감소
정신계 장애	흔함	비정상꿈
	흔하지 않음	이갈이
신경계 장애	알려지지 않음*	불면증, 초조, 공격성 ('5. 일반적 주의'항 참조)
	흔함	어지러움
눈 장애	알려지지 않음*	세로토닌 증후군, 두통
	드물음	산동 (폐쇄 우각 녹내장용 유발할 가능성이 있음 - '5. 일반적 주의'항 참조)
혈관계 장애	흔하지 않음	홍조
	알려지지 않음*	출혈 (명, 반사출혈)
생식계 및 유방 장애	알려지지 않음*	질 출혈
	매우 흔함	구역
위장관 장애	흔함	설사, 변비, 구토
	알려지지 않음*	위장관 출혈
피부, 피하조직 장애	흔함	전신성 가려움
	흔하지 않음	야간발한
	알려지지 않음*	혈관부종, 두드러기, 발진, 다한증

*시판 후 경험 결과에 근거함

임상시험에서 성기능장애가 아리조나 성격험 척도(Arizona Sexual Experience Scale: ASEX)로 조사되었습니다. 이 약 5~15mg 투여군에서는 위약과 차이가 나타나지 않았으나, 20mg 투여군에서는 이 약의 투여로 인한 성기능장애가 증가하였습니다. 또한, 보티옥세틴과 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor)의 치료와 관련된 성기능 장애(Treatment-Emergent Sexual Dysfunction; TESDF) 수준을 전향적으로 비교한 상위 성기능 변화 설문지(Changes in Sexual Functioning Questionnaire Short Form; CSFQ-14)를 사용한 2건의 이중-눈금, 활성 대조 시험이 수행되었습니다. SSR에 의한 TESDF 환자를 대상으로 한 가변용량시험에서, 이 약 10-20mg 투여군은 TESDF 개선에 있어 에스시탈로프람 10-20mg 투여군보다 통계적으로 유의하게 우수하였습니다. 건강한 피험자를 대상으로 한 고정 용량 시험에서, 이 약 10mg 투여군은 파록세틴 20mg 투여군에 비해 통계적으로 유의하게 우월하였으나, 20mg 투여군은 그렇지 않았습니다. 보티옥세틴 10mg와 20mg 모두 위약 대비 유의한 악화를 보이지 않았습니다. 역학연구에서 유사한 약리작용을 갖는 항우울제(SSRI, 삼환계 항우울제 등)를 복용한 50세 이상의 환자에서 골절위험이 증가하는 것이 나타났습니다. 이에 대한 작용기전이 알려지지 않았으므로, 이 약과의 관련성도 확인되지 않았습니다. 주요우울장애(MDD)를 알고 있는 총 308명의 만12~17세 청소년 환자를 대상으로 한 이중-눈금, 위약대조 임상시험에서의 이상반응 양상은 성인보다 높은 발현율을 나타낸 자살 생각 및 복통 관련 이상사례를 제외하고 성인과 유사하였습니다('14. 기타'항 참조).

※ 재시판에 따른 국내 시판 후 조사결과

국내에서 재시판을 위하여 6년 동안 3,263명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 17.13% (559/3,263명, 총 745건)로 보고되었습니다. 이중 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 및 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였습니다.

발현빈도	기관계	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 0.25% (8/3,263명, 9건)	인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 4.57% (149/3,263명, 162건)
드물게 (0.1% 미만)	위장관계 장애	-	복통, 위속도역류, 복부불쾌감, 위염, 식도염, 위궤상위염, 잇몸통증
	중추 및 말초신경계 장애	-	두통악화, 사지저림, 감각이상, 떨림, 현기증, 경좌불능증
	정신질환	우울증악화, 의도적자해, 자살	수면장애, 불안, 환각, 감정요동, 감정장애, 과다수면, 기분장애, 식욕증가, 의지상실증
	피부와 부속기관 장애	-	땀증가, 모발소실, 피부반색, 피부염
	전신 질환	-	전신쇠약, 가슴불편함, 신체불편, 얼굴부종
	방어기전 장애	-	감기, 백선증, 기관지염
	호흡기계 질환	-	기침, 천식, 가래증가
	근육-골격계 장애	-	관절통, 근육통
	대사 및 영양 질환	당뇨병	체중증가, 갈증, 체중감소, 당뇨병
	비뇨기계 질환	-	배뇨곤란, 빈뇨
흔하지 않음 (0.1% ~ 1% 미만)	간 및 담도계 질환	급성담낭염, 간염	급성담낭염, 간염
	청력 및 전정기관 장애	-	귀울림
	혈관 질환	-	정맥류
	생식기능 장애(남성)	양성전립선비대증	양성전립선비대증
	생식기능 장애(여성)	-	유선종
	자율신경계 장애	실신	실신
	적혈구 장애	-	철결핍빈혈
	일반 심혈관 질환	-	기립성저혈압
	기타 용어	상세불명외낭종	상세불명외낭종
	알려지지 않음 (0.1% ~ 1% 미만)	위장관계 장애	-
중추 및 말초신경계 장애		-	두통
정신질환		-	졸림, 진정
전신 질환		-	피로
	심장 박동 장애	-	두근거림

※ 국내 시판 후 이상사례 분석평가 결과

국내 시판 후 이상사례(재시판 이상사례 포함) 보고자료(1989-2020.12.31.)를 토대로 실마 리포트 분석평가 결과 추가적으로 확인된 이상사례는 다음과 같습니다. 다만, 이로써 곧 해당분과 다음의 이상사례 간에 인과관계를 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

- 대사 및 영양계: 체중증가

5. 일반적 주의

- 발작**
발작은 항우울제에 의한 잠재적인 위험입니다. 따라서, 발작의 병력이 있거나 불안정한 간질 환자에서는 주의하여 투여해야 합니다. 이 약을 투여 후 발작이 처음으로 나타난 환자 또는 발작 횟수가 증가한 경우에는 이 약의 투여를 중단해야 합니다.
- 조증/경조증**
이 약은 조증/경조증의 병력이 있는 환자에서는 주의하여 사용해야 하며, 조증 상태로 활성화된 환자의 경우에는 이 약의 투여를 중단해야 합니다.
- 공격성/초조**
이 약을 포함하여 항우울제로 치료를 하는 환자는 공격성, 분노, 초조, 자괴근민성의 감정을 경험할 수 있습니다. 환자의 상태와 질병 상태가 주의 깊게 관찰되어야 합니다. 환자(그리고 환자의 보호자)에게 공격성/초조 행동이 나타나거나 악화되는 경우 의사와 연락하도록 주의를 주어야 합니다.
- 출혈**
세로토닌성 작용이 있는 항우울제(선택적 세로토닌 재흡수 억제제; SSRIs, 세로토닌 노르아드레날린 재흡수 억제제; SNRIs) 사용 시 반사출혈, 자반병과 같은 출혈 이상, 위장관 또는 부인과 출혈과 같은 출혈 증상이 드물게 보고되었습니다. 세로토닌성 작용이 있는 항우울제는 산후출혈 위험을 증가시킬 수 있습니다 (7. 임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조). 항응고제 및/또는 혈소판 기능에 영향을 미치는 것으로 알려진 약물(예, 비경험 항응고제, 페노티아진계, 대부분의 삼환계 항우울제, 비스테로이드계 소염제(NSAIDs), 아스피린(아세틸살리실산; ASA)을 투여 중인 환자나 출혈 경향이 있거나 출혈 장애가 알려진 환자에게 이 약을 투여하는 경우 주의해야 합니다.
- 저나트륨혈증**
세로토닌성 작용이 있는 항우울제(SSRIs, SNRIs)의 사용시 항이뇨호르몬 분비 이상 증후군(SIADH)으로 인한 저나트륨혈증이 드물게 보고되었습니다. 노인, 간경변증 환자 또는 저나

트림혈증을 유발하는 것으로 알려진 약물을 병용투여 중인 환자 등과 같은 위험군 환자의 경우 주의하여야 합니다.

저나트륨혈증 증상을 보이는 환자에서는 이 약의 투여를 중단하고 적절한 치료를 시작해야 합니다.

6) 녹내장

이 약을 포함한 항우울제의 사용과 관련하여 산동이 보고되었습니다. 이러한 산동 효과는 안각을 좁혀 안구내압을 상승시키고 폐쇄 우각 녹내장을 유발할 가능성이 있습니다. 안구내압이 증가되었거나 폐쇄 우각 녹내장 위험이 있는 환자는 이 약을 주의하여 사용하여야 합니다.

7) 운전 및 기계 조작능에 대한 영향

건강한 피험자에서 이 약을 1일 10mg 단회 및 반복 투여 시 운전 및 기계 조작능, 인지 기능, 기타 정신동작 기능 등에 대한 영향이 없거나 무시할만한 것으로 나타났습니다. 그러나 운전 전이나 위험한 기계 조작 시 주의해야 합니다.

8) 중단 증후군

15mg/일 및 20mg/일 용량으로 이 약을 사용한 치료를 갑작스럽게 중단했을 때 임상 반응이 보고되었습니다. 가능한 갑작스런 중단보다는 점진적인 용량 감소가 권장됩니다. 세로토닌성 항우울제 중단 후, 특히 갑작스런 중단 후의 이상 반응에는 오심, 발한, 불쾌한 기분, 지극 과민성, 초조, 어지러움, 감각장애 (예, 감전 감각과 같은 지각 이상), 떨림, 불안, 혼돈, 두통, 기면, 감정 불안정성, 불면, 경조증, 이명, 발작이 포함됩니다.

6. 상호작용

이 약은 주로 간에서 산화 및 글루쿠루산 수 포함 (glucuronic acid conjugation)을 통해 광범위하게 대사됩니다. In vitro 시험에서, cytochrome P450 동중효소 CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2C19, CYP2C9, CYP2A6, CYP2C8, CYP2B6이 이 약의 대사에 관여합니다.

(1) 다른 약물이 이 약에 미치는 잠재적인 영향

(1) MAO 저해제

세로토닌 증후군 발생 위험 때문에, 이 약과 MAO 저해제는 병용투여하지 않습니다. MAO 저해제의 투여 중단 후 최소 14일이 경과한 후에 이 약의 투여를 시작해야 하며, MAO 저해제의 투여를 시작하기 최소 14일 전에 이 약의 투여를 중단하여야 합니다.

(2) 세로토닌성 약물

세로토닌성 작용이 있는 의약품(예, 아편제, 트라마돌, 트립탄계(수마트립탄 포함))과 이 약을 병용 투여하는 경우 세로토닌 증후군이 발생할 수 있습니다.

(3) St. John’s Wort (성요한의 풀)

세로토닌성 작용이 있는 항우울제와 성요한풀(St. John’s Wort(Hypericum perforatum))을 함유한 생약제제를 병용 투여하는 경우, 세로토닌 증후군을 포함하는 이상반응의 발생이 증가할 수 있습니다.

(4) 발작 역치(seizure threshold)를 낮추는 약물

세로토닌성 작용이 있는 항우울제는 발작 역치를 낮출 수 있습니다. 발작의 역치를 낮출 가능성이 있는 다른 약물(예, 항우울제(트립탄계, SSRIs, SNRIs), 신경이완제(페노치아진, 지오르틴, 부티로페논), 마프루핀, 부프로피온, S-와피린)과 병용 투여하는 경우 주의해야 합니다.

(5) 전기 경련 요법(Electroconvulsive Therapy; ECT)

이 약과 전기 경련 요법의 병행 치료에 대한 임상 경험이 없으므로 주의해야 합니다.

(6) 사이토크롬 P450 유도제

① CYP2D6 저해제: 건강한 피험자에게 이 약 1일 1회 10mg과 부프로피온(강력한 CYP2D6 저해제: 1일 2회, 1회 150mg)을 14일 동안 병용 투여했을 때, 이 약에 대한 노출(AUC)이 2.3배 증가하였습니다. 이 약을 부프로피온에 추가하는 때보다 부프로피온을 이 약에 추가하는 병용투여의 경우에 이상반응 발생률이 더 높게 나타났습니다. 강력한 CYP2D6 저해제(예, 부프로피온, 퀴나딘, 플루베타롤, 파록세틴)를 이 약에 추가하여 투여 하는 경우, 환자의 반응에 따라 이 약의 용량을 감소시킬 수 있습니다.

② CYP3A4, 2C9 저해제: 건강한 피험자에게 케토코나졸(CYP3A4/5 및 P-glycoprotein 저해제: 1일 1회, 400mg)을 6일간 투여 또는 플루코나졸(CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4/5 저해제: 1일 1회, 200mg)을 6일간 투여한 후 이 약을 병용 투여했을 때 이 약의 AUC가 각각 1.3배, 1.5배 증가하였습니다. 이 약의 용량 조절은 필요하지 않습니다.

③ CYP2C19 저해제: 건강한 피험자에게 이 약을 반복투여하였을 때의 약동학에서 오메프라졸(CYP2C19 저해제) 40mg 단회투여로 인한 영향은 관찰되지 않았습니다.

④ CYP2D6의 느린 대사자(poor metabolizer; PM): 이 약과 CYP3A4, CYP2C9의 강한 억제제를 CYP2D6의 느린 대사자에게 병용투여하는 시점이 별도로 실시되지는 않았지만, 이러한 환자들에서는 이 약의 노출이 상기 기술한 것보다 크게 증가할 것으로 예상합니다.

(7) 사이토크롬 P450 유도제

건강한 피험자에게 리람피산(CYP 동중효소의 광범위한 유도제; 1일 600mg)을 10일간 투여한 후, 이 약 20mg을 단회투여하였을 때 이 약의 AUC가 72% 감소하였습니다. 광범위한 사이토크롬 P450 유도제(예, 리람피산, 카르바마제핀, 페니토인)를 이 약에 추가하는 경우, 환자의 반응에 따라 이 약의 용량조절을 고려합니다.

(8) 알코올

건강한 피험자에게 에탄올 0.6g/kg과 이 약 20mg 또는 40mg의 단회 병용투여시, 위약에 비해 이 약 또는 알코올의 약물동태학적 영향이나 인지 기능의 유의한 손상이 관찰되지 않았습니다. 하지만, 항우울제 투여기간 중 알코올 섭취는 바람직하지 않습니다.

(9) 아스피린

건강한 피험자에서 아스피린을 1일 150mg 반복투여가 이 약의 반복투여 약동학에 영향을 미치지 않았습니다.

2) 이 약이 다른 약물에 미치는 잠재적인 영향

(1) 항응고제 및 항혈소판 약물: 건강한 피험자에게 안정 용량의 와파린과 이 약 반복 병용투여 시, INR, 프로트롬빈 또는 혈장 R-/S-와파린 수치에서 위약 대비 유의한 차이는 관찰되지 않았습니다. 또한, 건강한 피험자에서 이 약 반복 투여 후 아세틸살리실산을 1일 50mg 병용 투여하였을 때, 위약에 비하여 혈소판 응집 또는 아세틸살리실산의 약동학에 대한 유의한 저해작용은 관찰되지 않았습니다. 그러나 다른 세로토닌성 약물과 마찬가지로, 이 약과 경구용 항응고제 또는 항혈소판 약물을 병용투여 하는 경우, 약력학적 상호작용으로 인한 출혈 위험의 증가 가능성이 있으므로 주의해야 합니다.

(2) 사이토크롬 P450의 기질

① In vitro 시험에서 이 약은 사이토크롬 P450 동중효소의 억제나 유도에 대한 유의한 잠재 가능성을 나타내지 않았습니다.

② 건강한 피험자에게 이 약의 반복 투여 후 CYP450의 기질인 약물을 투여하였을 때, CYP2C19(오메프라졸, 디아제팜), CYP3A4/5(에치닐에스트라디올, 미다졸람), CYP2B6(부프로피온), CYP2C9(톨부타미드, S-와피린), CYP1A2(카페인), CYP2D6(덱스트로메토르판)에 대한 유의한 작용은 관찰되지 않았습니다.

③ 약력학적 상호작용은 관찰되지 않았습니다. 이 약 반복투여 후 디아제팜 10mg을 단회 병용 투여하였을 때, 위약에 비해 유의한 인지기능 손상은 관찰되지 않았습니다. 이 약과 경구용 피임약(에치닐에스트라디올 30μg/레보노르게스테릴 150μg)을 반복 병용 투여하였을 때, 성호르몬 수치는 위약에 비하여 유의한 차이를 보이지 않았습니다.

(3) 리튬, 트립탄판: 리튬을 정상상태까지 노출시킨 건강한 피험자에게 이 약을 반복 병용투여시, 임상적으로 유의한 영향은 관찰되지 않았습니다. 그러나 세로토닌성 작용이 있는 항우울제를 리튬 또는 트립탄판과 병용 투여하는 경우 항우울제의 효과가 증가되었다는 보고이 있으므로 이들 약물과 병용 투여할 경우 주의해야 합니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부

이 약을 임부에게 사용한 자료는 제한적입니다.

동물시험에서 최기형성은 나타나지 않았으나, 태아 체중에 대한 영향 및 골형성 지연이 관찰되었습니다.

임신 후기에 세로토닌성 약물을 사용한 임부의 신생아에서 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다: 호흡곤란, 청색증, 무호흡, 발작, 체온 불안정, 수유곤란, 구토, 저혈당증, 근육긴장완진, 근육이완저하, 과다분비, 떨림, 초조, 과민성, 기면증, 지속적인 울음, 졸림, 수면곤란. 이러한 증상은 과도한 세로토닌성 작용 또는 금단 작용으로 인한 것일 수 있습니다. 대부분의 경우 이는 출산 직후 또는 24시간 내에 나타납니다.

약학조사에서 임신 중에, 특히 임신 후기에 임부에게 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs)를 투여하는 것은 신생아지속성폐동맥고혈압(PPHN)의 위험성을 증가시키는 것으로 나타났습니다. 이 약과 신생아지속성폐동맥고혈압(PPHN)의 상관관계에 대한 시험은 실시되지 않았지만, 세로토닌의 농도를 증가시키는 이 약의 작용기전을 고려할 때 위험성을 배제할 수 없습니다. 임부의 경우에는 임상적 유의성이 태아에 대한 위험성을 상회하는 경우에 한하여 이 약을 사용해야 합니다.

관찰연구 데이터는 출산 전 한달 이내에 SSRI 또는 SNRI 노출에 따른 산후출혈의 위험성 증가(2배 미만)에 대한 근거를 제시하였습니다. 이 약의 치료와 산후출혈 간의 연관성을 조사한 연구는 없지만, 이 약의 작용기전을 고려할 때 위험성을 배제할 수 없습니다.

2) 수유부

동물시험 자료에서 이 약과 이 약의 대사체가 모유로 이행되었습니다. 이 약은 사람에서도 모유로 이행될 수 있으므로 수유를 받는 유아에서의 위험성을 배제할 수 없습니다.

임유에서서 수유의 유익성과 산모에 대한 치료의 유익성을 고려하여 수유 중단 또는 이 약의 투여 중단을 결정해야 합니다.

3) 수태능

수컷 및 암컷 랫드의 수태능 시험에서 이 약은 수태능, 정자의 질 또는 교미기능에 영향을 미치지 않았습니다.

유사제질의 항우울제(SSRI)가 가역적으로 정자의 질에 영향을 주었다는 사례보고가 있으나, 현재까지 사람의 수태능에 미치는 영향은 관찰되지 않았습니다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되지 않았으므로, 소아에게 이 약을 투여하는 것은 권장되지 않습니다⁽¹⁾. (경고항 참조).

주요우울장애를 가진 소아를 대상으로 1일 1회 5mg에서 20mg을 투여한 후 이 약의 약동학적 특성은 만 7세에서 17세 환자를 대상으로 실시한 약동학시험과 만 12세에서 17세 환자를 대상으로 실시한 주요우울장애 임상시험 데이터에 근거한 집단약동학분석을 통하여 평가되었습니다. 소아에서 이 약의 약동학은 성인과 유사하였습니다.

9. 고령자에 대한 투여

고령자에서 이 약의 안전성 및 유효성 자료는 제한적입니다. 따라서 65세 이상의 고령자에서 이 약을 1일 10mg 이상 투여할 경우는 주의해야 하고, 주의 깊은 모니터링이 요구됩니다.

10. 신장애 및 신장애 환자

1) 신장애 환자

중증 신장애 환자에 대한 자료는 제한적이므로, 이러한 환자에게 투여하는 경우 주의해야 합니다.

2) 신장애 환자

신장애 환자에 대한 약동학적 자료에 따라 간기능에 따른 용량 조절이 필요하지 않으나, 이러한 환자에게 투여하는 경우 주의해야 합니다.

11. 임상검사에 의한 영향

소변 약물 검사 간섭: 이 약을 투여한 환자의 소변 중 메타돈 약물 검사를 위하여 효소면역학적 분석법을 사용한 경우, 위양성 결과가 보고되었습니다. 소변 약물 검사 시 양성 결과의 해석에는 주의 기울여야 하며, 기타 다른 분석법(예: 크로마토그래피법)을 통한 확인을 고려해야 합니다.

12. 과량투여시의 처치

임상시험에서 이 약 40~75mg을 투여하였을 때 다음 이상반응의 약화를 유발하였습니다: 구역, 체위성 어지러움, 설사, 복부 불편감, 진전성 기려움, 졸림, 흉조.

시판 후 경험에서는 주로 이 약 80mg까지의 과량투여가 보고되었습니다. 대부분의 경우 증상이 없거나, 경미한 증상으로 보고되었습니다. 가장 흔하게 관찰된 이상반응은 구역과 구토였습니다. 이 약 80mg을 초과하여 과량 투여한 경험은 제한적입니다. 치료 용량 범위보다 수 배 높은 용량(약 500mg)에서 발작과 세로토닌 증후군의 발생이 보고된 바 있습니다. 과량투여시의 처치는 임상증상 치료와 함께 적절한 모니터링을 실시합니다. 특별한 환경에서 의학적 추적이 권장됩니다.

13. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

14. 기타

1) 작용기전

보티옥세틴의 작용기전은 세로토닌(5-HT) 수용체 활성화의 직접적인 조절과 세로토닌 수용체의 저해에 의한 것으로 여겨집니다. 비임상 시험에서 보티옥세틴은 5-HT₁, 5-HT₂ 및 5-HT₁₀ 수용체 길항제, 5-HT_{1B} 수용체 부분 효능제, 5-HT_{1A} 수용체 효능제, 그리고 세로토닌(5-HT) 수용체의 역제제로서 주로 세로토닌을 조절하지만 노르에피네프린, 도파민, 히스타민, 아세틸콜린, GABA, 글루타메이트 등 다양한 시냅스에서 신경전달의 조절을 야기하였습니다. 이렇게 다양한 작용으로 인하여 보티옥세틴이 동물 시험에서 항우울, 불안완화 효과, 인지 기능 및 학습 개선, 기억력 향상 효과를 나타낸 것으로 보입니다. 그러나 개별 작용과 약력학적 특성의 정확한 연관성은 아직 명확하지 않고, 동물 자료를 사람에게 직접 외삽할 때는 주의가 필요합니다. 용량에 따른 5-HT 수용체 점유율을 정량하기 위해 리간드를 사용한 2개의 PET 시험에서 솔기핵(raphe nuclei)에서의 평균 5-HT 수용체 점유율은 1일 5mg에서 50%, 1일 10mg에서 65%였고 20mg에서는 80%까지 증가되었습니다.

2) 임상적 유효성 및 안전성

보티옥세틴의 안전성과 유효성은 전체 6,700명 이상의 주요우울장애(MDD) 환자를 포함하는 임상 프로그램을 통해 연구되었고, 그 중 3,700명 이상이 12주 이하의 단기 임상시험에서 보티옥세틴에 노출되었습니다. 12개의 이중맹검, 위약 대조, 6/8주, 고정 용량 시험이 성인 및 고령자에서 주요우울장애에 대한 보티옥세틴의 단기 유효성을 연구하기 위하여 수행되었습니다. 보티옥세틴은 12개 중 9개 시험에서 MADRS(Montgomery and Asberg Depression Rating Scale) 또는 HAM-D₂₁(Hamilton Depression Rating Scale) 총 점수의 개선을 보였고, 약물에 반응하였거나 관해된 사람의 비율, CGI-h(Clinical Global Impression-Global Improvement)의 향상으로 임상적 관련성을 뒷받침하였습니다. 보티옥세틴의 유효성은 용량 증가에 따라 증가하였습니다. 또한 보티옥세틴은 1일 5-20mg범위에서 넓은 범위의 우울 증상에 대하여 효과(MADRS 10개 항목 모두 개선을 나타내었습니다. 주요우울장애 환자에 대한 12주, 이중눈가림, 가변용량, 활성 대조 시험에서 아고델린 1일 25 또는 50mg 대조 보티옥세틴 1일 10 또는 20mg의 유효성이 입증되었습니다. 보티옥세틴은 MADRS 총 점수의 개선에서 아고델린보다 통계적으로 유의하게 우월하였고, 약물에 반응하였거나 관해된 사람의 비율, CGI-h의 향상으로 임상적 관련성을 뒷받침하였습니다.

(1) 유효성
항우울효과가 유지되기 위해 개별 시험을 통해 입증되었습니다. 초기 12주 공개 라벨 치료 기간에 관해를 보인 환자를 이후 위약 또는 보티옥세틴에 무작위 배정하여 최소 24주 이상(24주~64주)의 이중맹검 기간 동안 개별이 발생하는 비율을 관찰하였습니다. 보티옥세틴은 주요우울장애 재발까지의 시간으로 측정된 일차 유효성 평가면에서 위약에 비해 우월하였고(p=0.004), hazard ratio는 2.0으로 개별 위험이 보티옥세틴 군에 비해 위약 군에서 2배 더 높았습니다.

(2) 고령자

65세 이상의 고령자 우울증 환자 452명(156명이 보티옥세틴을 투여받았습니다)을 대상으로 한 8주, 이중눈가림, 위약 대조, 고정용량시험에서 보티옥세틴 1일 5mg 투여는 MADRS 및 HAM-D₂₁ 총 점수의 개선에서 위약에 비하여 우월하였습니다.

(3) 중증의 우울 또는 우울과 높은 수준의 불안 증상을 함께 보이는 환자
항우울효과는 중증의 우울증 환자(기저 MADRS 총 점수 30점 이상)와 높은 수준의 불안 증상(기저 HAM-A 총 점수 20점 이상)을 보이는 중증 환자에 대해서도 고령자 및 성인에 대한 단기 시험과 장기 재발-예방 시험에서 입증되었습니다.

(4) 우울증의 인지기능 장애에 대한 효과

2) 안전성
성인 대상 1건의 고령자 대상 단기-위약 대조임상시험에서 보티옥세틴(1일 5~20 mg)의 효과를 연구하였습니다.

주요우울장애 환자에서 인지기능장애에 대한 보티옥세틴의 효과는 객관적 측정 지표인 DSST(Digit Symbol Substitution Test) 및 UPSA(University of California San Diego Performance-Based Skills Assessment), 주관적 측정 지표인 PDQ(Perceived Deficits Questionnaire) 및 CPFQ(Cognitive and Physical Functioning Questionnaire)를 이용하여 평가하였습니다.

DSST결과 결과 2건의 성인대상 임상시험에서는 위약군 대비 1.75 (p=0.019) ~ 4.26 (p<0.0001)범위의 변화를 보였고, 1건의 고령자 대상 임상시험에서는 위약군 대비 2.79 (p=0.023)의 변화를 나타내었습니다.

1건의 성인대상 임상시험에서 UPSA를 이용하여 기능적 능력(functional capacity)에 대한 보티옥세틴의 효과를 평가한 결과 보티옥세틴군은 8.0점, 위약군은 5.1점을 나타내었습니다 (p<0.001).

또한, PDQ를 이용한 주관적 평가 결과 보티옥세틴군은 -15.1점, 위약군은 -10.8점을 보였고 (p=0.020), CPFQ를 이용한 주관적 평가결과에서는 보티옥세틴군과 위약군에서 각각 -8.1점, -6.9점을 나타내었습니다(p=0.086).

(5) 내약성 및 안전성

보티옥세틴의 안전성과 내약성은 1일 5-20mg 범위 용량에 대해 단기/장기 시험에서 경미도었습니다. 보티옥세틴은 위약에 비해 불면이나 기면의 발생률을 증가시키지 않았습니다.

단기 및 장기 위약 대조 시험에서, 잠재적인 금단 증상이 급작스러운 보티옥세틴 치료 중단 후 나타나는지를 체계적으로 평가하였고, 보티옥세틴을 단기(6-12주) 및 장기(24-64주) 투여 후 금단 증상의 특성이나 발생률에서 위약에 비하여 임상적으로 유의한 차이는 없었습니다.

자가 보고된 생기능 이상의 발생률은 보티옥세틴의 단기 및 장기 시험에서 위약에 비해 낮거나 유사하였습니다. 아리조나 성경험 척도(ASEX)를 사용한 시험에서, 치료와 관련된 생기능 장애(TESD)의 발생률과 아리조나 성경험 척도(ASEX) 총 점수로 평가하였을 때, 보티옥세틴을 1일 5-15mg 복용하였을 때 나타나는 생기능 장애는 위약과 유의한 차이를 보이지 않았습니다. 1일 20mg을 복용하였을 때에는 위약에 비하여 TESED의 발생률이 증가하였습니다.

우울증상의 수준이 낮으며(기저 CGI-S≤3), 이전에 치료받은 SSRI(시탈로프람, 파록세틴, 설트랄린)와 관련된 TEDS 가 있는 환자를 대상으로 수행한 8주간의 이중눈가림, 가변용량, 대조 시험에서 보티옥세틴을 1일 10-20mg 복용하였을 때 SSRI 치료와 관련된 TEDS의 개선에 있어 에시탈로프람을 1일 10-20mg 복용하였을 때에 비해 통계적으로 유의하게 우수하였으며, 이는 CSFQ-14 총점의 개선을 통해 나타났습니다. (2.2점, p=0.013). 두 치료군 모두에서 항우울효과는 비슷하게 유지되었습니다. 생기능이 정상이며, 우울증에 의한 교란 효과없는 건강한 피험자를 대상으로 한 5주간의 이중-눈가림, 위약 및 파록세틴 대조 시험에서, CSFQ-14 총점 변화에 있어 보티옥세틴을 1일 10mg 복용하였을 때는(2.74점, p=0.009) 파록세틴을 1일 20mg 복용하였을 때 비해 통계적으로 유의하게 우수하였으나, 보티옥세틴을 1일 20mg 복용하였을 때는(1.05점, p=0.303) 유의한 차이를 보이지 않았습니다. 보티옥세틴 1일 10mg과 20mg 모두 위약 대비 유의한 약화를 보이지 않았습니다.

보티옥세틴은 위약과 비교하여 체중, 심박, 혈압에 대해 단기 및 장기 임상시험에서 영향이 없었습니다.

임상 시험의 간 및 신장 평가에서 임상적으로 유의한 변화는 관찰되지 않았습니다. 보티옥세틴은 주요우울장애 환자에게 QTc, QT, PR, QRS 간격 등을 포함하는 ECG 지표에서 임상적으로 유의한 영향을 보이지 않았습니다. 건강한 시험대상자에게 1일 40mg까지 투여한 QTc 측정시험(thorough QTc study)에서 QTc 간격 연장에 대한 가능성은 관찰되지 않았습니다.

만 12~17세의 주요우울장애(MDD) 청소년 환자를 대상으로 한 무작위배정, 이중눈가림, 위약/활성대조, 고정용량의 8주간의 임상시험이 수행되었습니다. 이 연구에는 표준 정신사회적 출제를 포함한 4주간의 단일눈가림, 위약 도입기간(N=77)에 반응이 없었던 대상자만을 무작위배정(N=615)하였을 때, 소아우울평가척도(CDRS-R) 총점에 근거하여 보티옥세틴 10mg/day 또는 20mg/day은 활성대조약(플루옥세틴 20mg/day)과 달리 위약보다 통계적으로 유의하게 우월하지 않았습니다.

이상반응 양상은 성인보다 높은 발현율을 나타낸 자살 생각 및 보통 관련 이상사례를 제외하고 성인과 유사하였습니다. 이상사례(주로 자살 생각, 오심, 구토)로 인한 중단은 보티옥세틴 20mg/day(5.6%)이 보티옥세틴 10mg/day(2.7%), 플루옥세틴(3.3%), 위약(1.3%)보다 높았습니다. 보티옥세틴 치료 그룹에서 가장 흔하게 보고된 이상사례는 오심, 구토, 두통이었습니. 4주 단일눈가림, 위약 도입 기간(위약 13/77(11.7%))과 8주 치료 기간(보티옥세틴 10mg/21/47(1.4%), 보티옥세틴 20mg/616(3.7%), 플루옥세틴 6/153 (3.9%)) 모두 이상사례로 자살 생각과 행동이 보고되었습니다. 컬럼비아-자살위험평가척도(C-SSRS) 상 자살 생각 및 행동은 치료그룹 전반에서 유사하였습니다.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30C) 보관

사용기한 : 제조일로부터 48개월 (제품 포장에 있는 사용기한 (Exp. data) 참조)
사용기한은 00(월)-00(일)-0000(년)의 형식으로 표시됩니다.

포장단위 : 28정

※ 사용기한이 지났거나 변질, 변태, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

제품 문의처 : 한국론드벡㈜ 고객센터전화 (02)431-6600

수입판매자 : **한국론드벡(주)**

서울시 송파구 올림픽로 35길 137 한광공모문화회관19층

제 조 원 : **H. Lundbeck A/S**

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

설명서 최종개정일자 : 2021.11.04

※ 이 첨부문서 최종개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.lundbeck.com/kr)를 통해 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 발생 시 한국약물관련권리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다.(1644-6223).

※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.

※ 첨부문서를 읽고 보관하도록 합니다.